


MÉXICO

Leishmaniasis cutánea y mucosa 2020

Índice compuesto de LC trienio (2018-2020)



324 nuevos casos notificados

Cutánea: 323 (99,7%)

Mucosa: 01 (0,3%)

5,81 incidencia/100.000 habitantes

BAJO nivel de transmisión

(Índice compuesto de LC trienio 2018-2020)

Nota: LC: leishmaniasis cutánea

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Sistema de información regional de leishmaniasis (SisLeish) [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2021 [consultado el 15 de octubre del 2021]. Acceso limitado.



ESPECIES DE LEISHMANIA: *L. braziliensis* y *L. mexicana*



VECTORES - LUTZOMYIA: *Lu. anthophora*, *Lu. cruciata*, *Lu. diabolica*, *Lu. gomezi*, *Lu. hart-mani*, *Lu. olmeca olmeca*, *Lu. ovallesi*, *Lu. panamensis*, *Lu. shannoni* y *Lu. ylephiletor*



MEDICAMENTOS DISPONIBLES: Anfotericina B liposomal y anfotericina B desoxicolato



GRUPO ETARIO

6% <10 años



SEXO

69,5% hombres



DIAGNÓSTICO

91% de los casos de LC/LM diagnosticados por laboratorio



CURACIÓN

31,5% de los pacientes curados entre los tratados



VIGILANCIA

4,3% de la población en zonas de transmisión



FRONTERAS

12% de los casos en fronteras internacionales

OPS

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud